



LTKH	Naistekliinik
Tähis:	Vorm

СТИМУЛЯЦИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Patsiendi
nimeteebis

Согласие пациента на процедуру

Стимуляция родовой деятельности применяется с целью повышения интенсивности родовых схваток при их недостаточной силе. Стимуляция так же применяется с целью предупреждения инфекции плода при преждевременном отхождении околоплодных вод, в случае, если по истечении 12 часов не развилось спонтанной родовой деятельности.

Причиной слабых и редких сокращений матки может быть:

- перерастяжение мышц матки (многоплодие, многоводие, крупный плод и др.)
- врождённая слабость мышц матки
- эпидуральная аналгезия
- ригидная шейка матки
- „усталость“ мышц матки в случае неэффективной, длительно протекающей родовой деятельности

Для усиления родовой деятельности используются следующие методы:

- вскрытие плодного пузыря (при наличии „зрелой шейки матки“)
- назначение медикаментов локально во влагалище, внутривенно капельно, или приёмом через рот: - простагландины (простенон) и мизопростол
- окситоцин

Метод родостимуляции определяет врач в зависимости от необходимости.

Возможные осложнения (относительно редко):

- несмотря на повторные попытки, родовой деятельности не развивается или не становится интенсивней
- слишком частые и болезненные сокращения матки, в этом случае используются расслабляющие средства или снижается скорость введения медикаментов
- неэффективная родостимуляция может закончиться операцией кесарева сечения

Показанием к родовозбуждению/стимуляции в Вашем случае является:

Согласна на родовозбуждение/стимуляцию :

Пациент _____

(Имя, фамилия, личный код)

(Подпись)

Число _____

Врач _____

(Имя, фамилия, печать, подпись)

Число _____